

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LOS CASOS DE VIRUELA DEL MONO EN ESPAÑA

Datos extraídos de SiViES el 11/10/2022 a las 07:50h

A fecha de esta actualización se han notificado 7.239 casos de viruela del mono procedentes de 17 Comunidades Autónomas (Tabla 1).

**Tabla 1. Nº de casos de viruela del mono declarados en SiViES según CCAA de notificación**

| CCAA                 | Nº de casos  | Porcentaje |
|----------------------|--------------|------------|
| Andalucía            | 870          | 12,1       |
| Aragón               | 74           | 1,0        |
| Asturias             | 59           | 0,8        |
| Baleares             | 210          | 2,9        |
| Canarias             | 173          | 2,4        |
| Cantabria            | 35           | 0,5        |
| Castilla La Mancha   | 64           | 0,9        |
| Castilla y León      | 84           | 1,2        |
| Cataluña             | 2.149        | 29,7       |
| Extremadura          | 32           | 0,4        |
| Galicia              | 121          | 1,7        |
| Madrid               | 2.500        | 34,5       |
| Murcia               | 75           | 1,0        |
| Navarra              | 21           | 0,3        |
| País Vasco           | 239          | 3,3        |
| La Rioja             | 6            | 0,1        |
| Comunidad Valenciana | 527          | 7,3        |
| <b>Total</b>         | <b>7.239</b> | <b>100</b> |

## 1. Características de los casos

Un total de 7.087 casos son hombres y 152 son mujeres; la edad oscila entre 7 meses y 88 años, con una mediana de edad de 37 años (rango intercuartílico: 31-44 años). El 66,5% de los casos tenía entre 30 y 49 años. El 44,6% (3.231 casos) había nacido en España (Tabla 2).

**Tabla 2. Características demográficas de los casos de viruela del mono declarados en SiViEs**

| Características demográficas       | Nº de casos  | Porcentaje |
|------------------------------------|--------------|------------|
| Sexo                               |              |            |
| Hombre                             | 7.087        | 97,9       |
| Mujer                              | 152          | 2,1        |
| Grupos de edad                     |              |            |
| Menor de 20                        | 59           | 0,8        |
| 20-29                              | 1.439        | 19,8       |
| 30-39                              | 2.763        | 38,2       |
| 40-49                              | 2.051        | 28,3       |
| 50-59                              | 752          | 10,4       |
| 60 y más                           | 161          | 2,2        |
| No consta información              | 14           | 0,2        |
| País de nacimiento                 |              |            |
| España                             | 3.231        | 44,6       |
| Europa Occidental                  | 291          | 4,1        |
| Europa Central-Este                | 101          | 1,4        |
| Latinoamérica                      | 1.787        | 24,7       |
| África del Norte y Oriente Próximo | 78           | 1,1        |
| África Subsahariana                | 22           | 0,3        |
| Otros                              | 66           | 0,9        |
| No consta información              | 1.663        | 22,9       |
| <b>Total</b>                       | <b>7.239</b> | <b>100</b> |

La distribución por edad y sexo se muestra en la figura 1.

**Figura 1. Nº de casos por grupos de edad y sexo**



Respecto al país de residencia, 46 casos diagnosticados en España residían en otros países. La mayoría de los casos españoles residían en la Comunidad de Madrid (Tabla 3).

**Tabla 3. Lugar de residencia de los casos de viruela del mono declarados en SiViEs**

| Residencia                         | Nº de casos  | Porcentaje |
|------------------------------------|--------------|------------|
| País de residencia                 |              |            |
| España                             | 7.109        | 98,2       |
| Europa Occidental                  | 23           | 0,3        |
| Europa Central-Este                | 4            | 0,1        |
| Latinoamérica                      | 6            | 0,1        |
| África del Norte y Oriente Próximo | 1            | 0,0        |
| África Subsahariana                | 1            | 0,0        |
| Otros                              | 11           | 0,1        |
| No consta información              | 84           | 1,2        |
| <b>Total</b>                       | <b>7.239</b> | <b>100</b> |
| CCAA de residencia*                |              |            |
| Andalucía <sup>a</sup>             | 876          | 12,3       |
| Aragón <sup>b</sup>                | 73           | 1,0        |
| Asturias                           | 57           | 0,8        |
| Balears                            | 199          | 2,8        |
| Canarias <sup>c</sup>              | 164          | 2,3        |
| Cataluña <sup>d</sup>              | 2.126        | 29,9       |
| Castilla La Mancha <sup>e</sup>    | 66           | 0,9        |
| Cantabria                          | 31           | 0,4        |
| Castilla y León <sup>f</sup>       | 87           | 1,2        |
| Extremadura                        | 30           | 0,4        |
| Galicia                            | 116          | 1,6        |
| Madrid <sup>g</sup>                | 2.449        | 34,5       |
| Murcia                             | 73           | 1,1        |
| Navarra                            | 20           | 0,3        |
| País Vasco <sup>h</sup>            | 241          | 3,4        |
| La Rioja                           | 6            | 0,1        |
| Comunidad Valenciana               | 493          | 6,9        |
| No consta información              | 2            | 0,1        |
| <b>Total</b>                       | <b>7.109</b> | <b>100</b> |

\* Para los casos residentes en España (n=7.109)

<sup>a</sup> Nueve casos residentes en Andalucía han sido notificados por Aragón, Cataluña, Madrid, Extremadura y C. Valenciana.

<sup>b</sup> Dos casos residentes en Aragón han sido notificados por Canarias y Galicia.

<sup>c</sup> Dos casos residentes en Canarias han sido notificados por Andalucía y Cataluña.

<sup>d</sup> Catorce casos residentes en Cataluña han sido notificados por Baleares, C. Valenciana, Madrid y Murcia.

<sup>e</sup> Tres casos residentes en Castilla La Mancha han sido notificados por Madrid.

<sup>f</sup> Tres casos residentes en Castilla y León han sido notificados por Cataluña, Galicia y Madrid.


<sup>g</sup> Treinta y seis residentes en Madrid han sido notificados por Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Cantabria, Extremadura, Galicia, Navarra y C. Valenciana.

<sup>h</sup> Dos casos residentes en el País Vasco han sido notificados por Cataluña y Cantabria.

## 2. Características de la enfermedad

Un total de 6.956 casos (96,1%) disponen de información sobre fecha de inicio de síntomas. La fecha de inicio de síntomas del primer caso notificado fue el 26 de abril y la del último el 7 de octubre. La curva epidémica según fecha de inicio de síntomas se muestra en la figura 2. La tendencia descendente de la curva puede estar afectada por retrasos en la notificación.

**Figura 2. Curva epidémica de casos confirmados de viruela del mono según fecha de inicio de síntomas (n=6.956)**



La mediana en días entre la fecha de inicio del primer síntoma y las fechas de diagnóstico de confirmación por laboratorio y la fecha de declaración a nivel de CCAA se muestra en la tabla 4.

**Tabla 4. Tiempo entre fecha de inicio de síntomas y fechas de confirmación por laboratorio y de declaración**

|  | Mediana (días) | RIC*  |
|--|----------------|-------|
| Fecha inicio síntomas – Fecha confirmación laboratorio (n=6.693) | 7              | [4-9] |
| Fecha inicio síntomas – Fecha de primera declaración (n=6.641)   | 6              | [3-9] |

\* RIC: Rango intercuartílico

### a) Aspectos clínicos

Un total de 5.252 casos (72,5%) presentaron alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea), siendo la fiebre la más frecuente. El exantema se localizó en la zona anogenital en el 63,5% de los casos (Tabla 5).

La mediana de días entre la fecha de inicio del primer síntoma y la fecha de aparición del exantema para los 6.162 casos que disponen de información fue de 0 días (RIC: 0-2).

**Tabla 5. Manifestaciones clínicas (n=7.239)**

| Manifestaciones clínicas*        | Nº de casos | Porcentaje |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Síntomas generales               |             |            |
| Fiebre                           | 4.154       | 57,4       |
| Astenia                          | 2.428       | 33,5       |
| Cefalea                          | 1.803       | 24,9       |
| Dolor muscular                   | 1.937       | 26,8       |
| Dolor de garganta                | 1.111       | 15,3       |
| Linfadenopatías                  |             |            |
| Localizadas                      | 3.434       | 47,4       |
| Generalizadas                    | 374         | 5,2        |
| Exantemas                        |             |            |
| Exantema anogenital              | 4.595       | 63,5       |
| Exantema oro-bucal               | 1.317       | 18,2       |
| Exantema de otras localizaciones | 4.078       | 56,3       |

\* Un mismo paciente puede presentar diferentes síntomas y signos

Un total de 461 pacientes de los 5.665 con información (8,1%) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico. Las complicaciones se describen en la tabla 6.

**Tabla 6. Complicaciones**

| Complicaciones*                       | Nº de casos |
|---------------------------------------|-------------|
| Úlcera bucal                          | 126         |
| Infección bacteriana secundaria       | 113         |
| Proctitis                             | 10          |
| Infección corneal                     | 8           |
| Úlceras genitales                     | 7           |
| Úlceras anales                        | 7           |
| Celulitis                             | 6           |
| Faringoamigdalitis                    | 6           |
| Absceso faríngeo/periamigdalino       | 5           |
| Herpes (no especificado)              | 4           |
| Uretritis                             | 4           |
| Miocarditis/Miocardopericarditis      | 3           |
| Despitelización zona genital dolorosa | 2           |
| Meningoencefalitis                    | 2           |
| Herpes zoster                         | 1           |
| Monoartralgias                        | 1           |
| Pielonefritis con sepsis              | 1           |
| Disfagia grave                        | 1           |
| Prostatitis                           | 1           |

\* Un mismo paciente puede tener varias complicaciones

De los 6.508 casos con información, 234 (3,6%) fueron hospitalizados entre el 5 de mayo y el 2 de octubre en diferentes comunidades autónomas: 67 de los casos notificados por Madrid, 47 por Cataluña, 28 por la Comunidad Valenciana, 23 por Andalucía, 13 por el País Vasco, 13 por Galicia, 7 por Aragón, 7 por Asturias, 7 por Baleares, 4 por Canarias, 4 por Castilla y León, 4 por Murcia, 3 por Castilla La Mancha, 3 por Cantabria, 2 por Extremadura y 2 por Navarra.

La mediana de días de ingreso hospitalario fue de 4 días (RIC: 2-7) aunque se desconoce, por el momento, la fecha de alta para 38 casos. La edad mediana de casos hospitalizados fue de 36 años (RIC: 29-43), la mayoría fueron varones (228 casos) y seis casos mujeres. Cuatro casos en varones fueron hospitalizados en la UCI (en uno de ellos el ingreso en UCI no estaba relacionado con la viruela del mono). Del total de casos, uno tenía diagnóstico de miocarditis leve con dos días de observación en UCI, dos casos con diagnóstico de meningoencefalitis y una persona con otras patologías e infección concomitante con monkeypox. Los tres últimos han fallecido.

Todos los casos fueron confirmados por PCR o secuenciación realizada en muestras de lesiones cutáneas (3.687 casos), líquido vesicular (2.267 casos), 176 casos en ambas muestras y 152 casos en muestras de exudado recto-anal, exudado procedente de lesiones en prepucio/pene o exudado faríngeo. En 957 casos no constaba información sobre el tipo de muestra.

#### b) Antecedentes personales

Un total de 2.624 casos de los 6.566 con información (39,9%) eran personas diagnosticadas de infección por el VIH y 70 casos de otras patologías concomitantes que pueden causar inmunosupresión.

Respecto a los antecedentes de vacunación de la viruela 211 casos estaban vacunados con alguna dosis. De ellos, la mayoría fueron españoles y latinoamericanos. La distribución del antecedente de vacunación según región de nacimiento y edad de los casos al diagnóstico de viruela del mono se muestra en la tabla 7.

**Tabla 7. Antecedentes de vacunación de la viruela según región de nacimiento y edad al diagnóstico de viruela del mono**

| Grupos de edad | Región de nacimiento |                   |               |                  |                |           | Total      |
|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|------------|
|                | España               | Europa Occidental | Latinoamérica | África del Norte | África del Sur | No consta |            |
| 20-29          | 1                    |                   | 19            |                  |                |           | 20         |
| 30-39          | 7                    |                   | 35            | 1                |                |           | 43         |
| 40-49          | 18                   | 2                 | 19            | 1                | 1              | 12        | 53         |
| 50-59          | 38                   | 5                 | 13            |                  |                | 13        | 69         |
| 60 o más       | 16                   | 1                 | 1             |                  |                | 5         | 23         |
| No consta      | 3                    |                   |               |                  |                |           | 3          |
| <b>Total</b>   | <b>83</b>            | <b>8</b>          | <b>87</b>     | <b>2</b>         | <b>1</b>       | <b>30</b> | <b>211</b> |

Cincuenta y ocho casos habían sido vacunados en el contexto del brote actual. Entre la fecha de la vacunación y el inicio de síntomas transcurrieron una mediana de 5 días (RIC: 1-26).

### 3. Características de la exposición

De los 6.321 casos con información sobre antecedentes de viaje internacional en los 21 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas, 945 (14,9%) habían viajado. En 34 de ellos se dispone de información sobre el destino (18 casos a Portugal, cinco casos a Estados Unidos, cuatro a Países Bajos, cuatro casos a Suiza y tres casos a Cuba).

Ciento setenta y nueve casos se han clasificado como casos importados.

De los 7.239 casos, 1.431 (19,8%) reportaron un contacto estrecho con un caso probable o confirmado.

Respecto al ámbito de exposición, 300 casos comunicaron la exposición durante actividades de ocio (no sexual), 176 casos exposición en el entorno familiar y 2 casos exposición en entorno sanitario.

Un total de 5.527 casos de los 7.239 casos analizados (76,4%) eran hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres, 146 casos eran hombres heterosexuales (2,1%), 81 casos mujeres heterosexuales (1,1%), 4 mujeres bisexuales (0,1%) y en 1.481 (20,5%) no se disponía de información. Excluyendo los casos sin información, estos porcentajes fueron del 95,9%, 2,5%, 1,4% y 0,1%, respectivamente.

De los 7.239 casos, 5.334 (73,6%) tenían información sobre el mecanismo de transmisión más probable. De éstos, en 4.424 casos (82,9%) la transmisión se atribuyó a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual, en 337 casos (6,3%) a un contacto estrecho no sexual (entre ellos los casos en niños), 2 casos a una exposición ocupacional en el ámbito sanitario, en 36 casos no se especifica (0,7%), y en los 535 restantes (10,1%) esta información está pendiente.

En relación a la asistencia a eventos multitudinarios, de los 5.731 casos con información en esta variable, 983 (17,1%) acudieron a algún evento en las fechas previas al inicio de síntomas. Un total de 83 casos asistieron al Gay Pride de Maspalomas (Gran Canaria), 156 casos en distintos eventos en Barcelona, 123 casos a distintos eventos en Madrid, 60 casos al Gay Pride de Torremolinos, 37 casos en el Gay Pride de Sitges, 17 en la fiesta del Orgullo en Valencia, 5 en la fiesta del Orgullo en Sevilla y 294 a otros eventos. En 218 casos no se especifica el evento al que asistieron.

Veinte casos están vinculados a un brote en un local de piercing.

### 4. Conclusiones:

- Se han notificado casos de viruela del mono en 17 de las 19 Comunidades y Ciudades Autónomas.
- La mayoría de los afectados son hombres, adultos y nacidos en España.
- Alrededor de siete de cada diez casos presentaron síntomas generales y en más del 60% de los casos el exantema se localizó en zona anogenital.
- La evolución de los pacientes en general fue favorable, aunque entre un 3-8% de los casos requirieron hospitalización y/o presentaron alguna complicación. Se han producido dos fallecimientos por meningoencefalitis asociadas a viruela del mono.

- En la mayoría de los casos la transmisión se atribuye a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual.
- Los datos incluidos en este informe están en continua actualización a través de las notificaciones de las CCAA a la plataforma SiViES por lo que los resultados aquí presentados deben considerarse provisionales.